

***Blicca bjoerkna*. Brema blanca**

No incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Media**
Oportunidad de actuación: **Baja**



Fuente: C. D. Timm, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Ciprínido parecido al carpín, de talla media que no suele sobrepasar los 25 cm de longitud total, aunque se han localizado ejemplares de 36 cm y 1 kg de peso. El cuerpo está comprimido lateralmente, alto y con la cabeza pequeña con respecto al tamaño del cuerpo. La aleta dorsal es muy alta, normalmente con ocho radios blandos y la anal larga con 19 a 22 radios blandos. Dientes faríngeos en dos filas aspecto que le diferencia de la especie europea (*Abramis brama*), que los presenta en una fila, diferenciándose de esta también por su coloración más clara y el mayor tamaño de las escamas. Línea lateral bien definida y escamas grandes con un número de 44-45 a lo largo de la línea lateral.

ECOLOGÍA. Poblaciones pequeñas. Vive en ríos, lagos y embalses con aguas quietas. Suelen formar cardúmenes en primavera y verano, mientras que en invierno se separan para hibernar. Se alimenta sobre el fondo de invertebrados acuáticos y plantas. La dieta de los juveniles se basa en zooplancton. La reproducción tiene lugar entre mayo y julio. La madurez sexual se alcanza a los tres años en machos y a los cuatro en hembras. Las hembras depositan los huevos sobre el sustrato, de 17000 a 100000, de tamaño pequeño y con un diámetro de 2 mm. Incubación de 4 a 6 días.

ORIGEN E HISTORIA. Especie europea, introducida en España hacia la década de los 90. La ausencia de interés deportivo o comercial de esta especie hacen inexplicable los motivos de su introducción.

DISTRIBUCIÓN. Distribuida por Europa desde los Pirineos a los Urales. Falta en las penínsulas mediterráneas. Existen poblaciones en el litoral mediterráneo en unas pocas localidades de Valencia, Almería y Cataluña. En Aragón, en los años 1990 se encontraron ejemplares adultos en el embalse de Joaquín Costa o Barasona (río Ésera, Huesca). Sin embargo, en el muestreo de 2008 no apareció en este embalse, pero sí en el de Ribarroja, en el Ebro y parece estar presente también en áreas del embalse de Mequinzena.

PROBLEMÁTICA. Desplaza a peces y otros organismos acuáticos. A pesar de habitar en Aragón, esta especie no parece problemática aquí.

¿QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a invasoras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de ésta u otras especies de peces.

