

## *Impatiens balfouri*, *Impatiens glandulifera*. Balsamina de Balfour, balsamina india, "nometoques" (*Balsaminaceae*)

No incluidas en el Catálogo Nacional de EEI  
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Baja** (Media en el Pirineo)  
Oportunidad de actuación: **Baja** (Media en Pirineo)



Fuente: J. Guerrero. DGA.

**BIOLOGÍA.** *Impatiens balfouri* es una planta anual glabra de 40 a 80 cm de altura. Hojas alternas ovales-lanceoladas. Flores rosa púrpura de 2 a 4 cm. *Impatiens glandulifera* se distingue de las otras especies de su género por sus hojas opuestas, sus grandes flores púrpuras y por su altura que sobrepasa los 2 m.

Habita en ambientes fértiles, perturbados y húmedos, como en los márgenes aluviales de ríos y barrancos, además de taludes húmedos. Es una especie de semisombra, pudiendo estar presente en el interior de los bosques aunque allí suele ser estéril.

**FLORACIÓN.** Junio- Octubre

**ORIGEN E HISTORIA.** Procedente del Himalaya, ha sido plantado como ornamental en muchos países.

**DISTRIBUCIÓN.** Se naturalizan e invaden muchas regiones templadas, como USA o Gran Bretaña y otros países del centro de Europa. En Aragón se conoce cultivado en zonas frescas rurales, especialmente en los pueblos del Pirineo: Sahún, Foradada del Toscar, Escalona, Aínsa, Ansó, Jaca, etc (Sanz Elorza, 2006). En ocasiones se naturaliza en ambientes ruderales cercanos a los pueblos, incluso en márgenes degradadas de ríos, como ocurre en Castejón de Sos o Villanova (Ribagorza).

**PROBLEMÁTICA.** En Gran Bretaña desplaza a la vegetación autóctona por lo que se organizan campañas de control.

**ACTUACIÓN.** Evitar uso en jardinería en zonas de riesgo. Remoción de la tierra para exponer las semillas al sol. Consumo por animales domésticos. Eliminación manual antes de la floración y disminución de la eutrofia donde sea posible, pues esta especie requiere suelos muy nitrogenados.

**ALTERNATIVAS.** *Gaura lindheimeri*, *Antirrhinum ssp.*

