

Melanoides tuberculata. Caracol malasio, Caracol trompeta

Incluida en el Catálogo Español de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Media**
 Oportunidad de actuación: **Media**



Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Caracol de agua dulce de concha cónica, de espiral alargada y muy resistente. La concha es de colores marrones o pardos, en ocasiones con bandas verticales en forma de espiral y/o manchas negras irregulares. No suele sobrepasar los 50 mm de altura ni los 10 mm de diámetro.

HÁBITAT. Habita en áreas templadas, en aguas tranquilas y poco profundas con predominio de sustratos con fango y/o arena. Soporta bajas concentraciones de oxígeno y diversas salinidades, pero no así la contaminación.

ORIGEN E HISTORIA. Nativa de Malasia y de otras zonas tropicales del sudeste asiático. Introducido a través de su uso en acuariofilia,

DISTRIBUCIÓN. En España fue citado por primera vez en 1974 en Castellón y se ha ido extendiendo con rapidez en aguas templadas y termales. Es abundante en las aguas termales de Alhama de Aragón y podría estar en otras zonas termales de Aragón.

PROBLEMÁTICA. Presenta ciertas ventajas frente a otros caracoles acuáticos autóctonos (como el amenazado *Melanopsis penchinati*) debido a la mayor resistencia de su concha, lo que lo hace presa difícil para muchos depredadores, su adaptabilidad a todo tipo de hábitats y su gran capacidad de reproducción. Podría ocasionar la reducción de la población de *Melanopsis penchinati* en Alhama, por competencia por el alimento. Es un vector de transmisión de parásitos para otros organismos.

ACTUACIÓN. Captura manual de los individuos. Control sobre cualquier masa de agua que pueda desecarse. Evitar en la práctica su uso en acuariofilia.

¿QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier área de Aragón, excepto en las termas de Alhama. Intenta concienciar a tus conocidos acuarófilos para que no utilicen a esta especie.

