Spartium junceum. Gayomba, retama de olor (*Fabaceae*)

No incluida en el Catálogo de EEI para la península ibérica
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Media**
Oportunidad de actuación: **Media**

- Este arbusto similar a la retama, con bellas flores amarillas, ha sido muy utilizado como ornamental, plantado también para la fijación de taludes, especialmente en vías de comunicación. De allí, algunos ejemplares se asilvestran en márgenes, cunetas y campos de cultivo abandonados, ocasionalmente en pastizales y matorrales.
- Procede del norte de África y Oriente próximo, pero algunos autores la consideran también originaria del sureste de España. En Aragón se ha plantado profusamente. A partir de esas plantaciones, se ha observado naturalizado al menos en Juslibol, junto a un soto; en puntos del Somontano del Moncayo, en Ejea, en Guara (entre Bierge y Las Almunias), y especialmente en los alrededores de minas restauradas en comarcas como Cuencas Mineras (Utrillas, etc.).
- Deben vigilarse sus poblaciones, especialmente si se observa que se naturaliza en áreas con vegetación natural. Procediendo en ese caso a su eliminación.
- Alternativas. *Retama sphaerocarpa, Cytisus spp., Coronilla glauca*.

Fuente: J. Puente

Tradescantia fluminensis. Oreja de gato, amor de hombre (*Commelinaceae*)

Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: **Baja**
Oportunidad de actuación: **Media**

- Planta herbácea, perenne, rizomatosa, de 30-50 cm, con tallos muy ramificados. Florece de marzo a septiembre. Se reproduce por semilla y por medio de sus tallos con gran capacidad de emitir raíces en los nudos. Excelente flotabilidad, por lo que pueden ser dispersados corriente abajo por ríos y canales.
- Originaria de América del Sur, del SE de Brasil hasta Argentina. Introducida en España y en casi todos los países del mundo como ornamental. Es muy popular en jardinería de interior y como tapizantes en jardines umbríos.
- Naturalizada en ambientes umbríos, húmedos y muy abrigados, en algunos puntos de la costa mediterránea, gallega y cantábrica oriental y también en unos pocos enclaves cálidos del interior. También aparece mas efímeramente en ambientes antrópicos (cunetas húmedas, pies de muros, etc.).
- Se debe evitar su cultivo ornamental en zonas de riesgo. El método de control y erradicación más eficaz es el sombreado artificial de los rodales, y para pequeñas áreas invadidas es efectiva la retirada manual (Sanz Elorza et al. 2004).
- Alternativas. *Hedera helix* subsp. *minor*

Fuente: Wikimedia Commons. Detalle flor: William M. Ciesla, Forest Health Management International, Bugwood.org